



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

Bollettino Fitosanitario VITE n. 4 del 20/05/2019

PERUGIA E TERNI

Lunghezza germogli superiore ai 10 cm., quarta foglia distesa; Infiorescenze rignonfie, i fiori sono ancora chiusi e raggruppati tra loro. (BBCH 15- BBCH 55).

PERONOSPORA

Non sono state segnalati all'attualità sintomi di peronospora.

In considerazione dell'instabilità climatica e conseguente previsione di possibili ulteriori piogge si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica dove i germogli hanno raggiunto i 10 cm di lunghezza con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), acilalanine (metalaxil, metalaxil-m), Fluopicolide, ecc., scelti in funzione della fase fenologica, associati a prodotti di copertura.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE ecc. in funzione della recettività della zona.

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2017/2018, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>