



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 3 DEL 13/05/2019

PERUGIA E TERNI

In base ai dati pervenuti con il progetto SMART METEO e dati osservati da questo servizio fitosanitario si propone quanto segue:

Fase fenologica:

Lunghezza germogli superiore ai 10 cm., quarta foglia distesa; Infiorescenze rigonfie, i fiori sono ancora chiusi e raggruppati tra loro. (BBCH 15- BBCH 55).

PERONOSPORA

Non sono state segnalate all'attualità macchie d'olio di peronospora. In considerazione dell'instabilità climatica e conseguente previsione di possibili ulteriori piogge si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica dove i germogli hanno raggiunto i 10 cm di lunghezza con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), acilalanine (metalaxil, metalaxil-m), scelti in funzione della fase fenologica raggiunta, ecc., associati a prodotti di copertura.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE ecc

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2018-2019 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali) al seguente link:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2017/2018, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>