




4.c. Fine fioritura



5. Allegagione

## FASE FENOLOGICA

La fase fenologica prevalente in tutta la Regione è di fine fioritura – inizio allegagione.  
(BBCH: 69)

Fonte: Olea – Trattato di olivicoltura

## OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleaginea*)

In fioritura non sono consigliati interventi.

Nelle zone in cui è finita la fioritura e in caso di forte pressione del patogeno, viste le precipitazioni previste per i prossimi giorni si consiglia di intervenire con prodotti rameici.

## TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Non sono consigliati trattamenti.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2019 -2020 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa dell'olivo sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura dell'olivo vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2019/2020, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>