



**Chiusura del grappolo** - Gli acini hanno raggiunto circa il 70% della loro dimensione finale e cominciano a toccarsi. A seconda delle varietà la chiusura è più o meno lenta e in alcuni casi incompleta.

**Invaiaura** - Gli acini iniziano a diventare traslucidi e/o cambiano colore a seconda della varietà. Il grappolo diventa più compatto, è la prima tappa della maturazione.

## **FASE FENOLOGICA**

**Chiusura del grappolo (BBCH 77)**  
**Invaiaura (BBCH 81)**

**Previsioni meteo Tempo in peggioramento domenica con precipitazioni sparse, più probabili nel Nord della Regione e calo termico. Tempo stabile dalla prossima settimana.**

## **PERONOSPORA**

Presenza di sporadici sintomi di peronospora sul territorio regionale su foglia e su grappolo.

Si consiglia di intervenire in presenza di eventuali prolungate bagnature con prodotti preferibilmente rameici.

## **OIDIO**

In assenza di copertura antioidica intervenire preferibilmente con Zolfi bagnabili o in polvere non oltre la fase fenologica dell'invaiaura

## **TIGNOLETTA DELLA VITE**

Fase terminale del volo della 1 generazione carpofofa. Inizio 2 generazione carpofofa in alcuni siti dell'Orvietano. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>